

Neuer Impfstoff gegen eitrige Hirnhautentzündung durch Meningokokken Typ B

Update: 26. April 2014

Im Rahmen der Zulassungsstudie wurden von Nebenwirkungen berichtet.

Es gibt noch keine Information von Seiten des Impfstoffherstellers zu den Nebenwirkungen.

Update: 20. September 2013

Im Rahmen der Zulassungsstudie wurden von Nebenwirkungen berichtet. Bevor Dr. Fischer diesen Impfstoff uneingeschränkt empfiehlt, wird er weitere Informationen abwarten und sich auf dem Laufenden halten.

Stand: 13. Juli 2013

Seit kurzem gibt es einen Impfstoff gegen Meningokokken **Typ B**.

Er hat die Zulassung zur Anwendung ab dem 2. Lebensmonat und es wird erwartet, dass er ab Oktober 2013 im Handel sein wird.

Bislang konnte nur gegen die Untergruppe Meningokokken **Typ C** geimpft werden.

Aktuell ist noch nicht klar, ob die Impfung allgemein empfohlen wird (Ständige Impfkommission "STIKO") und ob die Krankenkassen die Kosten übernehmen werden.

Meningokokken sind Bakterien und Erreger von eitrigen Hirnhautentzündungen.

In Deutschland gibt es fast ausschließlich Typ C und Typ B (im Verhältnis 20% zu 80%).

Jeder 10. Mensch in Deutschland trägt die Erreger im Mund und Rachenraum ohne daran zu erkranken.

Die Ansteckung erfolgt über Tröpfchen-Infektion, das heißt Husten, Niesen oder direkten Kontakt. In Deutschland erkranken ca. 700-800 Menschen jährlich.

Mehr als 40% der Erkrankten sind unter 4 Jahre alt (Kindergartenalter).

Trotz intensivmedizinischen Maßnahmen sterben ca. 10% der Patienten.

Relativ häufig kommt es zu schweren Restschäden bis hin zum Verlust von Fingern Zehen Händen oder ganzen Extremitäten.

Das **Impfschema für Säuglinge unter 6 Monate** besteht aus:

- 3 Impfungen - jeweils mind. 1 Monat Abstand
- + 1 Auffrischimpfung - zwischen 12 und 23 Monaten.

Das **Impfschema für Kinder zwischen 6 Monate und 2 Jahren** besteht aus :

- 2 Impfungen - mind. 2 Monate Abstand
- + 1 Auffrischimpfung - zwischen 12 und 23 Monaten.

Das **Impfschema für Kinder ab 2 Jahre bis 10 Jahre** besteht aus:

2 Impfungen

- mind. 2 Monate Abstand
- Über eine Auffrischimpfung ist bislang noch nichts bekannt.

Das **Impfschema** für **Jugendliche und Erwachsene** besteht aus:

2 Impfungen

- mind. 1 Monat Abstand
- Über eine Auffrischimpfung ist bislang noch nichts bekannt.